



على هامش مؤتمر الكويت السنوي لأمراض صحة الرجل

د. الحنيان: ارتفاع معدل الضعف الجنسي بين الرجال ليصل 30% بعد الأربعين

كشف استشاري أمراض المسالك البولية والاستاذ في كلية الطب بجامعة الكويت ورئيس رابطة المسالك البولية د. عادل الحنيان عن ارتفاع معدل الضعف الجنسي بين الرجال في دولة الكويت، حيث بلغ 75% عند الذين تصل معدل أعمارهم إلى الستين عاماً فما فوق، و30% بعد سن الأربعين، و20% لدى من هم دون ذلك.


وأضاف الحنيان في تصريح صحافي على هامش مؤتمر الكويت السنوي لأمراض صحة الرجل الذي بحث آخر المستجدات الطبية المتعلقة بأمراض صحة الرجل كالضعف الجنسي ومشاكل الإنجاب والعقم، كما أشار الدكتور عادل الحنيان إلى أن مشاكل الضعف الجنسي مرتبطة بالأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب.



دول أوروبية. ولفت الحنيان إلى أن عمليات الأجهزة التعويضية تعد حلاً للكشف على الحالات على مدار يومين. بالإضافة إلى محاضرات وحضور أطباء من

وذكر أن التحدثين يعد في المقدمة، وقد أشار إلى أن نسبة مرضى السكر المصابين بالعجز الجنسي في البلاد بلغت 85%، وذلك بحسب أخصي دراسة أجريت في البلاد لذلك شد الحنيان على ضرورة اهتمام الأطباء بسؤال مرضى السكر

ماذا يحدث في الدماغ باللحظات الأخيرة قبل الموت؟



«24»: يعتقد الباحثون، أنهم باتوا على بعد خطوة لكشف أحد أهم الأسرار التي حيرت البشرية لسنوات طويلة، وذلك بمعرفة ما يحدث داخل الدماغ البشري قبل لحظات من الموت. ويقول الباحثون إن الدماغ البشري يستمر بالعمل لمدة 5 دقائق، وهذا يعني أن من المحتمل أن يعود الإنسان إلى الحياة خلال هذه المدة، ولكن بعد هذا الوقت، يتوقف النشاط الكهربائي في الدماغ، مما يجعل إنعاش صاحبه أمراً مستحيلًا. وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد دراسة دماغ 9 أشخاص في مرحلة الموت السريري، واقترحت الدراسة أن الوفاة ليست نقطة واحدة، بل سلسلة من العمليات تحدث في الجسم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وتبدأ الخلايا بالموت، عند توقف عبور الدم من خلالها، وبعد ذلك، تبدأ بسحب إمدادات الطاقة الاحتياطية، ويعتقد الخبراء أن هذا ما يمتدحها الفترة على العمل الوقت، بعد توقف القلب عن العمل. ويسودي ذلك إلى انهيار الدماغ.

مفاجأة طبية.. 3 أنواع جديدة من «السكري»



«24»: فجر باحثون من فلندا والسويد من خلال دراسة جديدة مفاجأة في المجال الطبي، مؤكدين أن السكري خمسة أنواع مختلفة وليس نوعين فقط (السكري النوع الأول والنوع الثاني) بخلاف ما هو شائع في المجال الطبي. وتشارك في الدراسة باحثون من مركز أبحاث السكري التابع لجامعة لوند السويدية ومعهد دراسة الطب الجزيئي في فلندا، وتوصلوا لاكتشاف بعد تحليل دم 14755 مريضاً، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وتكمن أهمية التقسيم الجديد لأنواع السكري في المساهمة بتحسين طريقة العلاج مع المزيد من الدقة في أليات التشخيص. وعند الباحثون الأنواع الخمسة من السكري حسب تصنيفهم الجديد، على الشكل التالي: النوع الأول: مرض السكري الجاد حيث يكون الجهاز المعاعي ضعيف جداً ويعجز فيها الجسم عن إنتاج الأنسولين، وهو يتدرج بنفس تصنيف الفئة الأولى من السكري المتعارف عليها طبيًا، وعادة ما يصاب به الشخص في مرحلة الطفولة ولكن يمكن أن يظهر في بعض الحالات عند البالغين، وهذا النوع يتطلب حقن الأنسولين مدى الحياة. النوع الثاني: يعانون من صعوبة بالغة في إفراز الأنسولين فيتم تصنيف هؤلاء

الأحماض الدهنية تحسن أعراض التوحد لدى الأطفال الخدج



«العربية»: أقيمت دراسة أمريكية حديثة بين مزيجا من مكملات الأحماض الدهنية (أوميغا 3، وأوميغا 6، يمكن أن يحسن أعراض مرض التوحد لدى الأطفال الخدج. الدراسة أجراها باحثون في مستشفى للأطفال في ولاية أوهايو الأمريكية، ونشروا نتائجها في عدد الخميس، من دورية Journal of Nutrition العلمية. والأطفال الخدج مصطلح يطلق على كل طفل يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل (الأطفال المتسرون)، ويعانون من مشاكل صحية، بسبب عدم إنتاج الوقت الكافي لتخفق أعضائهم، ويحتاجون لرعاية طبية خاصة حتى تتمكن أعضاؤهم من العمل دون مساعدة خارجية. وأجرى الباحثون دراستهم لرصد فعالية مزيج من مكملات الأحماض الدهنية «أوميغا 3، وأوميغا 6» لدى الأطفال المصابين بالتوحد، ولدوا قبل اكتمال حمل الأم بـ 11 أسبوعاً، بحسب ما نقلت وكالة «النايول».

دراسة: مكملات الحديد مفيدة لصحة المواليد منخفضي الوزن



«النايول»: أظهرت دراسة سويدية حديثة، أن مكملات الحديد يمكن أن تقي الأطفال الذين كانوا منخفضي الوزن عند الولادة، من المشاكل الصحية وإيرضا أمراض القلب والأوعية الدموية. الدراسة أجراها باحثون بجامعة أوبو السويدية، ونشروا نتائجها في عدد الجمعة، من دورية الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم. وبحسب الفريق، فإن وزن الطفل الطبيعي عند الولادة يكون ما بين 2.5 كيلوجرام إلى 4 كيلو جرامات، وإذا انخفض وزنه عن 2.5 كيلوجرام، فإن المواليد يعانون من مشاكل صحية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون 285 طفلاً من ولادتهم عند الولادة بين 2 إلى 2.5 كيلوجراماً، بالإضافة إلى 95 طفلاً كانت أوزنهم طبيعية عند الولادة. ورصد الباحثون نتائج اختبارات ضغط الدم وسكر الدم والدهون، لدى المجموعتين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للكفاءة. وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين كان وزنهم أقل من 2.5 كيلوجراماً عند الولادة يواجهون عادة مشاكل صحية أبرزها الصعوبات المعرفية وذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من حياتهم. ووجد الفريق أن منخفضي الوزن عند الولادة كانوا أكثر عرضة لانخفاض وزنهم في سن السابعة، والمهتت لديهم علامات مبكرة على اضطرابات في سكر الدم، ما يعرضهم للمستقبل لخطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية عند الكبر.

وأثبتت الدراسة أيضاً أن الأطفال الرضع منخفضي الوزن الذين تلقوا مكملات الحديد في وقت مبكر من ولادتهم، كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط الدم، ما وفر لهم حماية من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، بالمقارنة مع أقرانهم الذين لم يتلقوا تلك المكملات. وقالت الدكتورة جوزفين ستارنبرج، قائد فريق البحث: «كانت النتائج مثيرة للدهشة، حيث أن الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة الذين تلقوا مكملات الحديد في وقت مبكر، كانوا أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم في سن المدرسة، بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل». وأضاف: «تظل النتائج وسيلة حماية جزئية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، بالنسبة للأطفال منخفضي الوزن عند الولادة».

المصابين بالتوحد، ومرض التوحد، اضطراب عصبي يؤدي إلى ضعف التفاعل الاجتماعي والتواصل لدى الأطفال، وتتطلب معايير تشخيصه ضرورة أن تصبح الأعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر 3 سنوات، ويؤثر

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقدر من 15 مليون طفل يولدون مبكراً، ويموت حوالي مليون طفل سنوياً نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة، فيما يواجه العديد منهم مشاكل الإعاقات في النمو على المدى الطويل.