



القائمة طويلة وهي تهدد المناطق الفقيرة في العالم بشكل أكبر

أمراض العيون الأكثر شيوعاً .. في العالم

لعب الإنسان خصوصيته في التعامل عن سائر أعضاء الجسد، فهي الأكثر رقة وحساسية سواء من الجانب التشريحي أو الوظيفي، ولا يمكن ملامسة واقع ما والإمام به من دون النظر إليه والتأكد منه، فكما نستطيع العين كشف الحقائق والأحداث، يمكننا أننعكس الكثير عن الأشخاص كحالهم النفسية أو المرضية، لتعمل مؤشراً إلى وجود علة ما تستدعي مراجعة الطبيب سواء العيون أو غيره .

لذا شعر الإنسان بانهيج العينين أو تنوش بالرؤية أثناء العمل، فقد يكون ذلك نتيجة لقضائه فترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، أما وجود بقع خضر فيمكن أن يكون دليلة على ارتفاع ضغط الدم، بينما قد يدل وجود احمرار بإحدى العينين أو كليهما إلى وجود التهاب في العين، فما هي أمراض العيون الأكثر شيوعاً؟ وما طرق علاجها والوقاية منها؟

عدد المصابين بالعمى الكلي بمختلف أنحاء العالم يتجاوز 43 مليون شخص أغلبهم من سكان الدول النامية

بسبب سهولة انتقالها بين التجمعات السكانية المكتظة، وحتى في المناطق الريفية بين طلاب المدارس وعلى مستوى الأسرة الواحدة، وعلى سبيل المثال تنتشر مرض التراخوما عن طريق اللامسة المباشرة أو عن طريق استعمال ملابس أو مناشف شخص مصاب به، وقد يصل حد الضماعتات إلى العمى الكلي، مع أن أغلبية الأشخاص المصابين به يستبعدون هذا المسير المؤلم .

وهناك قائمة طويلة من عيوب الإبصار التي تصاب بها الأشخاص في مختلف مراحل حياتهم، ولكن أكثرها انتشارا هي قصر البصر، أي عدم قدرة العين على الرؤية المثالية عن قرب، على العكس من طول البصر، وهي مشكلة يزداد احتمال حدوثها مع تقدم عمر الإنسان. والتهابات خاصة الفيروسية والحساسية التي لها علاقة بأمراض الجسم كاعتلال الشبكية والسكري، وتزيد نسبتها عند إصابة المريض بالسكري .

أما ضعف البصر فأسبابه متعددة، ويتعلق بعضها بأمراض معروفة، فيما تعود الأخرى إلى أسباب وراثية يصعب التكن بوقت حصولها، غير أن مراجعة الطبيب بشكل منتظم واعتماد الفحص الدوري لحالة البصر يمكنهما تقليل نسبة الخاطر التي قد تصيب هذا الجزء الحساس .

ولأسرة دور كبير في حماية الأطفال من مخاطر إصابات العيون، خاصة أن الأطفال حتى سن متقدمة لا يمكنهم إدراك مخاطر اللعب في الأجسام الحادة والمظلمة، وقد يلحقون بعيونهم، وخاصة القرنية، أضرارا قد يتعذر التعامل معها جراحيا . وتسجل عيادات الطوارئ

الكثير من الحالات الخطرة .

أطفالنا وصحة عيونهم المعروف أن القرنية هي نافذة العين الأمامية الشفافة التي ينظر عبرها الضوء إلى العين لترى عيادات الطوارئ، إصابة عيون الأطفال بالأمراض الحادة، مثل السكاكين وأقلام الرصاص والمواد الكيميائية المنزلية ووراثية الزيت الساخن من المطبخ .

وتندهر صحة القرنية عند إصابها بالعُدوى، سواء كانت بكتيرية أو فطرية أو فيروسية . وعند الإصابة بمرض فيروس، مثل الحصبة أو الحمى النكفية والبرد، يعمد الطبيب إلى متابعة أي أعراض جانبية قد تصل إلى العصب البصري المسؤول عن نقل الصور التي تراها العينان إلى المخ على هيئة نبضات كهربائية، وعند حدوث إصابة من هذا النوع، تلوث أسجة العصب، ويعتري الألياف العصبية خلل في طبيعة عملها، ويجب فحص العصب إذا اشتكى المريض عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين بشكل مفاجئ .

وهناك نوع من الغلوكوما المياه الزرقاء، تصيب الأطفال كنوع من العيوب الخلقية . ويسبب هذه المشكلة يرتفع مستوى الضغط في العين، ويؤدي ذلك إلى تلف العصب البصري، ما قد يهدد بفقدان القدرة على الإبصار بشكل تدريجي، ومن

بين الأعراض التي يمكن ملاحظتها على الطفل، غزارة أمهال الدمع من العينين، وزيادة طر سوادهما . وعند التأكد من إصابة الطفل بالغلوكوما الخلقية، ينبغي الإسراع في علاجها لحماية العصب البصري، وحماية العينين من الإصابة بالعمى .

إن ارتفاع المستوى الصحي العلاجي للأطفال الخرج (المولودين قبل إكمال مدة الحمل) أو ناقصي الوزن، أدى إلى الحاجة إلى كميات محفزة من الأكسجين، ما قد يؤدي إلى الإصابة بنمو غير طبيعي للأوعية الدموية للشبكية .

ويقول الدكتور منتصر صلاح الدين، اختصاصي (أ) طب وجراحة العيون، عضو الكلية للمكة لجراحي العيون (لندن)، إن هذا النمو غير الطبيعي قد يتطور لآزرف بالشبكية أو الجسم الزجاجي، كما قد يؤدي في الحالات المتأخرة إلى انفصام بالشبكية، وهذا قد يؤدي إلى فقد الإبصار بإحدى أو كلتا العينين .

وقال: لهذا ينحتم متابعة الرضيع وفق جدول زمني محدد يتم خلاله توسيع حدقة العينين ورؤية الشبكية للتعرف إلى التغيرات في وقت مبكر، وعند التعرف إلى أي بداية مؤثرة لتطور أوعية دموية جديدة يتم علاج الشبكية عن طريق الليزر، كما أنه في الحالات المتقدمة والنادرة قد يلزم التدخل الجراحي، وذلك لتصحيح انفصام الشبكية، ويمكننا القول إن المتابعة الدقيقة والساعط .

ومن المعروف أنه إذ لم نستطع العين إرسال إرسادات بصرية صحيحة إلى الدماغ، فإننا نكون إزاء ما يعرف بالحول الولادي، والعلاج المبكر هو المفتاح للنجاح.

وإن الأغلبية العظمى من الحالات لا تحتاج إلى أي نوع من العلاج . الحول عند الأطفال وحول العينين هو من العيوب الخلقية أيضا، وبالنسبة إلى إصابة الأطفال بالحول يقول الدكتور عمار عبداللطيف، اختصاصي طب وجراحة العيون قائلا: غالبا ما يلاحظ من قبل الأهل، وهو عبارة عن انحراف محور العين من الداخل أو الخارج ويكون بأسباب عدة تتدرج من تدني القدرة البصرية في العين لأسباب بصرية، أو حرمان العين من وصول الضوء الكافي إلى العينين، ما قد يؤدي إلى الإصابة بنمو غير طبيعي للأوعية الدموية للشبكية .

ويقول الدكتور منتصر صلاح الدين، اختصاصي (أ) طب وجراحة العيون، عضو الكلية للمكة لجراحي العيون (لندن)، إن هذا النمو غير الطبيعي قد يتطور لآزرف بالشبكية أو الجسم الزجاجي، كما قد يؤدي في الحالات المتأخرة إلى انفصام بالشبكية، وهذا قد يؤدي إلى فقد الإبصار بإحدى أو كلتا العينين .

وقال: لهذا ينحتم متابعة الرضيع وفق جدول زمني محدد يتم خلاله توسيع حدقة العينين ورؤية الشبكية للتعرف إلى التغيرات في وقت مبكر، وعند التعرف إلى أي بداية مؤثرة لتطور أوعية دموية جديدة يتم علاج الشبكية عن طريق الليزر، كما أنه في الحالات المتقدمة والنادرة قد يلزم التدخل الجراحي، وذلك لتصحيح انفصام الشبكية، ويمكننا القول إن المتابعة الدقيقة والساعط .

ومن المعروف أنه إذ لم نستطع العين إرسال إرسادات بصرية صحيحة إلى الدماغ، فإننا نكون إزاء ما يعرف بالحول الولادي، والعلاج المبكر هو المفتاح للنجاح.

وقال: لهذا ينحتم متابعة الرضيع وفق جدول زمني محدد يتم خلاله توسيع حدقة العينين ورؤية الشبكية للتعرف إلى التغيرات في وقت مبكر، وعند التعرف إلى أي بداية مؤثرة لتطور أوعية دموية جديدة يتم علاج الشبكية عن طريق الليزر، كما أنه في الحالات المتقدمة والنادرة قد يلزم التدخل الجراحي، وذلك لتصحيح انفصام الشبكية، ويمكننا القول إن المتابعة الدقيقة والساعط .

ومن المعروف أنه إذ لم نستطع العين إرسال إرسادات بصرية صحيحة إلى الدماغ، فإننا نكون إزاء ما يعرف بالحول الولادي، والعلاج المبكر هو المفتاح للنجاح.

باحثون : الشاي الأخضر يقلل من أمراض القلب ويخفض الوزن



أما الشاي الأبيض فيساعد في توسيع شرايين القلب ويحبط تصلب الشرايين كما يخفف ضغط الدم والكوليسترول. ويساعد الشاي الأبيض على حماية القلب والأوعية الدموية. ويقلل من مخاطر السرطان ويحسن اضطرابات الجهاز الهضمي ويغوي جهاز المناعة ويقي من المشاكل الجنسية.

أما الشاي البايونج فيقي من الأرق، ويهدئ الأعصاب، كما يخفف من القلق. ومن جهة أخرى، أكدت الجريدة الأمريكية للطب الوقائي أن الشاي الأسود يحمي القلب من خلال خفض مستوى التريجليسيريد والكوليسترول.

لكن يحسب عناية مايو كلينيك الأمريكية يعد الشاي الأسود الأغني بالكافيين- ما قد يضرب من يعاني من ارتفاع ضغط الدم وحقان القلب.

زيت الزيتون يخلصك من مستويات السكر والكوليسترول العالية في الدم

أشارت نتائج دراسة جرت في إيطاليا إلى أن زيت الزيتون البكر الخالص قد يخفف من مستويات السكر والكوليسترول الضار في الدم بالمقارنة بمصناعات الدهون الأخرى.

وقال الباحثون إن ذلك قد يعسر ارتباط وجبات منقطة حوض البحر المتوسط التقليدية الغنية بزيت الزيتون بتراجع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن جهته، قال فرانسيسكو فيولي، الباحث بجامعة سابيتسا في روما وكبير لمشرفين على الدراسة: «خفض السكر والكوليسترول في الدم يعد الوجبات قد يكون مفيدا لنحد من مخاطرهما على القلب والأوعية الدموية».

واختبر فيولي وفريقه البحثي آثار إضافة زيت الزيتون البكر الخالص للوجبات التقليدية لمنطقة حوض البحر المتوسط التي تعتمد على الفاكهة والخضروات والحبوب والأسماك مع الإقلال من تناول منتجات

اللبان واللحوم الحمراء. وبعد قياس مستوى السكر والكوليسترول الضار المنخفض الخثافة في الدم قبل الأكل وبعد ساعتين، وجد أن مستوى المادتين تراجع بعد وجبة تضمنت زيت الزيتون البكر الخالص.

ويؤدي تراكم الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية إلى الإصابة بتصلب الشرايين وجلطات الدم والأزمات القلبية. وأوضح فيولي أن هذه النتيجة تدعم دراسات سابقة أشارت إلى أن زيت الزيتون البكر الخالص يزيد من مستوى الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تحويل السكر إلى طاقة.

وفي سياق متصل، وجد فريق البحث أنه بعد تناول وجبات تحتوي على زيت الخرة ارتفعت مستويات الكوليسترول المفيد والضرر في أن واحد، فيما حدث العكس مع الغذاء المحتوي على زيت الزيتون البكر الخالص.



لا يراجعون أطباء العيون بصورة كافية حتى مراحل متقدمة من اختلال الشبكية، الأمر الذي يجعل من مسألة العلاج اسرا بغاية الصعوبة .

وأشار إلى ضرورة مشورة لاكتشاف بعوض دورية مشورة لاكتشاف أي إصابة في العين في مراحلها الأولى ومساعدة المريض على استعادة الرؤية السوية، حيث إن مرضى السكري بشكل عام يراجعون الطبيب بعد سنوات من بدء اختلال الشبكية وهذه مراحل متقدمة جدا لا يمكن عندها إلا العمل على إصلاح أجزاء من الشبكية والمند من نقشي الخلل إلى الأجزاء التي تعمل .


مرض الطفرة وأشهر إلى مرض الطفرة (الحلمية)، وهو عبارة عن زيادة من الملحمة في الجزء الداخلي من العين، وتكون شائعة في السيدات الحاصرة مثل الإشارات بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وقد تؤدي إلى تغير في انكسار العين واحمرار مزمن والعلاج يكون بالتدخل الجراحي واستئصال الجزء الزائد. العشا الليلي

أما عن العشا الليلي وعدم الرؤية بوضوح مساء، فأرجع الدكتور منتصر سبب حدوثه إلى التهاب الشبكية الصبغي، وهو مرض وراثي متعدد الطرق سواء في طرق التورث أو في نوعية ودرجة الإصابة، وكذلك في تطور الحالة المرضية، وذلك لنقص في مستقبلات الضوء، كما ينحسر مجال الرؤية قليلا وفي بعض الحالات المتقدمة يكون هناك ضمور في العصب البصري وعامة في عدسة العين، كما قد تكون هناك بعض الحالات الوراثية التي تصيب أجهزة أخرى في الجسم .

وفي أغلب الأحيان يتم التشخيص بالفحص الأكلينيكي . ولكن في بعض الحالات قد يلزم عمل فحص فرج الجهد الكهربائي للشبكية للضغط، ويمكن أن يغطي نوع واحد الطبقي للأسرة لمعرفة كيفية التورث، وذلك لتقديم النصيحة في هذا المجال، حيث إن بعض الحالات تصيب الذكور فقط كونها مرتبطة بالكروموسوم الأنثوي وأحيانا أخرى يكون التورث بصفة مهيمنة أو متنحية، ومتابعة المريض تغيير ضرورة وذلك لمواكبة تطور الحالة .

دراسة: التوت البري يحارب السرطان ويحد من نموه

والحبوب، كما تثبت التجارب أن النمط الكسول في الحياة وقلة ممارسة الرياضة يزيد من خطر الموت بمرض سرطان القولون، وبالمقابل يشجع المرض بشكل وراثي في بعض العائلات، إلا أن ذلك لا يشكل سوى ٥ ٪ من حالات الإصابة. وكان الباحثون قد أجروا تجاربهم على فئران مخبرية مصابة بسرطان القولون، ووجدوا بعد عشرين اسبوعا من تناول التوت البري أن الأورام الخبيثة قد قلت بنسبة ١٠ ٪، ولم تتناول التوت كما أنهم لم يحصلوا على ذات النتائج عندما قاموا بفصل عناصر التوت البري عن بعضها بعضا، لذا لم يتمكنوا من تحديد مادة فعالة واحدة، وحال بعضهم بأنه لا وجود لمادة فعالة، بل إن حبة التوت تضاهي كل عناصرها في المادة الفعالة في القضاء على السرطان.



والإنتانات داخل الجسم . وأشار البروفيسور بيوري إلى أعراض المياه البيضاء التي تتمثل في فقدان تدريجي للبصر، أما في الحالات المتأخرة فتكون أعراض أخرى، ويتم العلاج بعملية جراحية عادة تحت تخدير موضعي حيث يتم من خلال فتحة دقيقة بالقرنية استخدام الموجات فوق الصوتية والليزر التي تقلل أحداث طرق العلاج، وذلك لسحب المياه البيضاء ثم يتم زرع عدسة ميساسة دائمة غير قابلة للتلف عوضا عن العدسة الأصلية، وتستغرق هذه العملية دقائق معدودة، ويسترد المريض بصره بمجرد إزالة المياه البيضاء في معظم الحالات ولكن في بعض الحالات يستعيد تدريجيا.

المياه الزرقاء أما عن الأمراض الوراثية في الدولة التي تنتج عن زواج الأقارب وتنتقل في أمراض الشبكية التي منها المياه الزرقاء التي تسمى بارنغ ضغط العين والغلوكوما، قال الدكتور منتصر صلاح الدين، إن ارتفاع ضغط العين يصيب نحو 2 ٪ من الأشخاص عالميا، والنوع الشائع منه هو الذي ليس له أعراض ويتم اكتشافه بالصدفة أو في المراحل المتأخرة منه، ولهذا ينصح لمن هم فوق سن الـ 40 بمراجعة طبيب العيون للفحص الدوري خاصة من له أقارب من الدرجة الأولى كالوالدين أو الأخوة المصابين بارتفاع ضغط العين . وأشار إلى أنه لا يوجد جد فاصل لاعتبار الضغط مرتفعا، ولكن إذا كان ضغط العين أكثر من 21 ملممترًا زئبقيا فيعتبر مرتفعا، وهذا يستوجب فحص قاع العين لدراسة العصب البصري، كما يجب فحص مجال البصر لمعرفة تأثير ارتفاع الضغط كما يصبح بفحص العينين فحصا كاملا .

وفي حالة التأكد من الإصابة به يلزم مراجعة الطبيب بصورة دورية مدى العمر، وقد يحتاج المريض إلى قطرات مخففة للضغط، ويمكن أن يغطي نوع واحد أو أكثر، كما في بعض الحالات قد يخضع المريض للعلاج بالليزر أو الجراحة .

السكري والعيون وأوضح الدكتور منتصر أن مرض السكري الواسع الانتشار ملحوظا بأعداد المصابين بمرض اعتلال الشبكية في الدولة، وعزا السبب إلى أن معظم المصابين به

ينصح مرضى العيون باستخدام النظارة الشمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية واستخدام القطرات المرطبة

صحيح أن جميع المواليد الجدد يمكن أن يتعرضوا إلى انخفاض في القدرة على الإبصار، إلا أن بعضا منهم يكونون في حالة ضعف بصري قصير ومزمن، وإذا ما استمر الرضيع على حالة الحول لأكثر من ثلاثة أشهر بعد الولادة، فإن هذا يعني ضرورة اللجوء إلى علاج طبي عاجل لإزالة من حول دائم، ويجزم المتخصصون في طب العيون أن الحول جديورا وراثية يمكن انتقالها من الأجداد أو الأباء إلى الأبناء .

وعن تعريف المياه البيضاء وأسبابها وطرق علاجها، قال البروفيسور الروسي بيوري تاكتيف، جراحة العيون والمياه البيضاء، مستشفى دار العيون، إنها عبارة عن كثافة تتشكل تدريجيا في عدسة العين الشفافة ونسب تدني تدريجيا لحد الإبصار غالبا تصيب العين، ولكن ليس بالضرورة بنفس الوقت، وتكون مصاحبة للتقدم في العمر وتزيد في البلاد الحارة وفي حالات الإصابة بمرض السكري .

وأضاف: أصبح من الواضح تماما أن الحول الذي يحدث بعد بلوغ الطفل سن السابعة يكون صعبا وعصيا على العلاج، لذا فإن وصف نظارة طبية للطفل الذي يحل مخاطر الإصابة بالحول، يمكن أن يساعد كثيرا على تجنب مثل هذه الحالة .

وقال: إن ما يقال عن مخاطر الحول ينطبق أيضا على بعد النظر وتحدث القرنية الاستجماتزم، كما يمكن لأباء ملاحظة بعض المظاهر في أسلوب تحديق أبنائهم نحو الأشياء عن بعد أو عن قرب منها، أو عدم القدرة على فتح العينين عند التعرض للملحني لنور الشمس الساطع .

ومن المعروف أنه إذ لم نستطع العين إرسال إرسادات بصرية صحيحة إلى الدماغ، فإننا نكون إزاء ما يعرف بالحول الولادي، والعلاج المبكر هو المفتاح للنجاح.

ومن المعروف أنه إذ لم نستطع العين إرسال إرسادات بصرية صحيحة إلى الدماغ، فإننا نكون إزاء ما يعرف بالحول الولادي، والعلاج المبكر هو المفتاح للنجاح.

لا يعرف العلماء ما هي للمادة الفعالة في «التوت البري» والتي تعطيه خصائص عجيبة في محاربة السرطان، لكنهم يعملون شيئا واحدا أكدته دراسة حديثة قامت بها جامعة «ماساتشوستس» في دارموث الأمريكية، هو أن التوت البري بمحتوياته الكاملة يبدو كأنه يحد من الحد من نمو السورم الخبيث الذي يصيب أكثر من مليون إنسان في العالم سنويا، ويقلل ما لا يقل عن ٧٥ ٪ من مرضى في كل عام، مستهدفا الدول المتقدمة بشكل خاص، سرطان القولون. والتوت البري من مكونات لبنتمكثوا من تحديد المادة الفعالة واستخدامها في تصنيع عقاقير جديدة، دون أن تتجح محاولاتهم، فإن توصياتهم الجديدة تقضي بالا يعتمد المصابون بسرطان القولون على عصير التوت البري، بل على تناول حبات التوت

كاملة، إذ إن عناصر من قشر التوت البري –والتي لا توجد في العصائر– قد تكون وراء الخصائص العجيبة للتوت. يصيب سرطان القولون واحدا من كل عشرين إنسانا (أي ٥ ٪ من البشر)، خصوصا في أمريكا والدول المتقدمة، ويصنف في أمريكا على أنه ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا (باعتناء سرطانات الجلد)، كما أنه ثالث أكثر أنواع السرطانات المسببة للموت في كل من الجنسين، في حين فإن معدلات الإصابة به تنخفض في الدول النامية وبلدان العالم الثالث، وتصل لحدود أدنى بكثير (أقل بحوالي عشرة أضعاف) في دول إفريقيا وجنوب آسيا. وتفسر الدراسات شيوع سرطان القولون في الدول المتقدمة بالمقارنة مع الدول الأكثر فقرا بسبب النمط الغذائي الذي يعتمد بشكل رئيسي على اللحوم الحمراء على حساب الألياف والخضار